

あなたを守る

# ポイント

蜂対策編



建設業労働災害防止協会

## 1. 危険な蜂の種類と危険性が高まる時期

- ①日本に生息する蜂で、人を攻撃したり、刺す蜂は、「スズメバチ」、「アシナガバチ」、「ミツバチ」の三種類。
- ②蜂の危険性が高まる時期は、蜂の種類で異なる。

★一番危険な蜂は「オオスズメバチ」

巣に数m近づくだけで威嚇をはじめ、現場にとどまれば攻撃を開始。

☆「キイロスズメバチ」

大型の巣を作り、攻撃性も高く危険。

スズメバチは、7月から11月までと長い期間活動。

☆「アシナガバチ」

アシナガバチの活動期間は、7月から10月と長い、7月から8月にかけてが、最も危険。

〔参考〕



オオスズメバチ



キイロスズメバチ



アシナガバチ

## 2. 蜂の特性



- ①蜂は、手を振ったり、体を左右にひねる動作に、敏感に反応。
- ②巣の近くでは、手足の屈伸や急激な動作は避ける。

## 3. 色への反応



- ①蜂は「黒色」に対して最も激しく反応。
- ②「白色」、「銀色」に対する反応は弱い。
- ③「黄色」にはほとんど攻撃性が認められない。
- ④一度巣の近くで蜂を怒らせると無差別に攻撃する。

## 4. 蜂刺されの症状と処置



### 局所症状

激しい痛み

### 全身症状

軽い 症状	全身のかゆみ
	けんないかん 倦怠感
	息苦しさ

中 程 度	胸の苦しさ
	腹痛
	げり 下痢⇒はき気

重 症	息苦しく、物が飲み込めない
	全身から力が抜け、うすくまる
	眼が見えない、耳が聞こえない
	意識障害

4


## 5. 蜂刺されの処置

最も重い症状は、気道がはれ（浮腫）をおこし、窒息死する。これが「アナフィラキシーショック」といわれる。

### 【処置方法】

□蜂に刺された時は、

- ①刺されたら直ち（2分以内）に毒を吸い出す。
- ②症状が重い場合には医療機関に搬送して治療を受ける必要があります。



※なお、一般的にいわれているアンモニアは、蜂刺されには効果がないので注意する。

※中程度以上のショック症状の緊急対応では、あらかじめ医師が処方した「自己注射器（商品名：エビペン注射液）」を携帯するのの一つの方法です。

5

## 6. 蜂に刺されないために

### 【巣の所在を知っている場合】



- ①巣を見つけたら、早めに叩き落とすか、殺虫剤を噴霧して取り除く。

6

- ②巣に気付いたら、そばに近づかない。蜂が頻繁に出入りしている場合は、巣のある可能性が高いため、黄色のテープ等で危険区域を表示し、立ち入らないようにする。

- ③蜂は、刺激や震動に敏感に反応する。近くで作業する場合は、顔面を保護するための「防蜂網（防護網）」を着用する。



7

【巣の所在が分からない場合】



【注意事項】

- ①作業中の服装は、白色系の着衣、または、黄色等の明るい服装をする。
- ②黒色の着衣は身につけない。
- ③蜂は、頭部や顔面をねらって攻撃してくる。
- ④暑い時期に難点はあるが、防蜂網（防護網）を着用する。

防蜂網の例



例年 7 月から 10 月にかけては、「蜂や毒虫」に悩まされる季節です。

数年前に一度ご案内しましたが、軽量かつ小型で、半永久的に、蜂や毒虫に刺されたその傷口から直接毒を吸い取る「応急処置用の毒吸引器」のご案内です。 R3.9.3

ご注文は → → → 袋井地区建設事業協同組合へ 斡旋期間：9月24日（金）まで

**ポイズンリムーバー M-7742 「応急処置用の毒吸引器」**



一般小売価格 5,400 円のところ、会員価格3,500円(税込)で斡旋します。